

1. ПМП начинается с:

- а) оказания неотложной помощи
- б) определения тяжести повреждения
- в) определения объема ПМП
- г) немедленного прекращения воздействия внешних повреждающих факторов

2. Основное свойство перевязочного материала:

- а) эластичность
- б) гигроскопичность
- в) мягкость
- г) упругость

3. Кровотечение в межтканевое пространство вызывает:

- а) гематому
- б) сепсис
- в) гангрену
- г) абцесс

4. Кровотечение из поврежденных артерий:

- а) капиллярное
- б) артериальное
- в) венозное
- г) внутриполостное

5. Дыхание в норме:

- а) 20-25 дых. в 1'
- б) 16-20 дых. в 1'
- в) 14-15 дых. в 1'
- г) 15-16 дых. в 1'

6. Один из признаков биологической смерти:

- а) трупное окоченение
- б) отсутствие сердцебиения
- в) отсутствие пульса
- г) отсутствие дыхания

7. Соотношение циклов при сердечно-легочной реанимации:

- а) 2:30
- б) 1:15
- в) 2:15
- г) 1:30

8. При переломе, для уменьшения болей, пострадавшему дают:

- а) анальгин
- б) тетрациклин
- в) активированный уголь
- г) димедрол

9. Омертвление всех слоев кожи возникает при ожогах:

- а) I степени
- б) II степени
- в) III степени "А"
- г) III степени "Б"

10. Причиной химического ожога является:

- а) кипяток
- б) фосфор
- в) соли тяжелых металлов
- г) кислоты

11. Учащение пульса:

- а) брадикардия
- б) тахикардия
- в) брадипное
- г) тахипное

12. Учащенное дыхание:

- а) брадикардия
- б) тахикардия
- в) брадипное
- г) тахипное

13. Транспортировка пациента при травме позвоночника:
- а) сидя
  - б) полусидя
  - в) лежа на животе
  - г) лежа на спине
14. Проникающее ранение грудной клетки, опасно развитием:
- а) сепсиса
  - б) столбняка
  - в) гангрены
  - г) пневмоторокса
15. Первая медицинская помощь при пищевых отравлениях:
- а) ИВЛ
  - б) СЛР
  - в) противошоковая терапия
  - г) промывание желудка
16. Эффективное средство лечения от укусов ядовитых змей:
- а) промывание желудка
  - б) дача слабительного
  - в) болеутоляющие средства
  - г) введение противозмеиной сыворотки
17. Трахеостомия проводится при:
- а) остановке сердца
  - б) остановке дыхания
  - в) полном закрытии просвета гортани
  - г) отсутствии сознания
- 18) Признаками остановки дыхания являются:
- а) отсутствие пульса
  - б) снижение АД
  - в) цианоз кожи
  - г) отсутствие экскурсии грудной клетки
- 19) К симптомам клинической смерти относят:
- а) отсутствие дыхания
  - б) отсутствие сознания
  - в) отсутствие сердцебиения
  - г) все ответы верны
20. Симптомы острой дыхательной недостаточности :
- а) цианоз
  - б) рвота
  - в) сухость кожи
  - г) повышение температуры
21. Первая медицинская помощь при обмороке:
- а) посадить пациента
  - б) приподнять головной конец
  - в) приподнять ножной конец
  - г) дать нитроглицерин под язык
22. При пищевом отравлении необходимо:
- а) обильное питье, вызвать рвоту
  - б) дать слабительное
  - в) измерить АД
  - г) определить РS
23. Кратковременная потеря сознания, однократная рвота характерна при:
- а) ушибе головного мозга
  - б) сдавлении головного мозга
  - в) переломе основания черепа
  - г) сотрясении головного мозга
24. При утоплении реанимацию начинают с:
- а) ИВЛ
  - б) непрямого массажа сердца
  - в) освобождение дыхательных путей от воды
  - г) введение обезболивающих
25. К жестким повязкам относят:
- а) бинтовые
  - б) гипсовые
  - в) клеевые
  - г) косыночные

26. При каких обстоятельствах наступает естественная смерть:
- а) убийство
  - б) старость
  - в) болезнь
  - г) острое нарушение мозгового кровообращения
27. Необратимые изменения в тканях наступает при:
- а) дистрофии
  - б) клинической смерти
  - в) биологической смерти
  - г) анафилактическом шоке
28. Полное отсутствие дыхания, кровообращения и рефлектов при:
- а) голодании
  - б) дистрофии
  - в) гипертрофии
  - г) клинической смерти
29. Первая медицинская помощь при альвеолите:
- а) антигистаминные лекарственные средства
  - б) жаропонижающие лекарственные средства
  - в) обезболивающие лекарственные средства
  - г) противорвотные лекарственные средства
30. После удаления зуба, пищу не принимать в течении:
- а) сутки
  - б) 8-10 часов
  - в) 2-3 часа
  - г) 30 минут
31. Время наложения жгута зимой:
- а) 3 часа
  - б) 1 час
  - в) 2 часа
  - г) 4 часа
32. Время наложения жгута летом:
- а) 1 час
  - б) 3 часа
  - в) 2 часа
  - г) 4 часа
33. Оптимальный срок оказания первой медицинской помощи при отравлении:
- а) 45 минут
  - б) 30 минут
  - в) 1 час
  - г) 10 минут
34. Оптимальный срок оказания первой медицинской помощи при остановке сердца:
- а) 2 часа
  - б) 1 час
  - в) 10 минут
  - г) 5 минут
35. Поднести к носу ватный шарик, смоченный нашатырным спиртом при:
- а) коллапсе
  - б) шоке
  - в) коме
  - г) обмороке
36. Нельзя давать вдыхать нашатырный спирт при:
- а) обмороке
  - б) шоке
  - в) коллапсе
  - г) коме
37. Шок, возникающий на фоне острого инфекционного процесса:
- а) травматический
  - б) гиповолемический
  - в) кардиогенный
  - г) септический
38. Состояние резкого торможения деятельности головного мозга:
- а) обморок
  - б) кома
  - в) шок
  - г) коллапс

39. Пальцевое прижатие артерии характерно для кровотечения:
- а) венозного
  - б) капиллярного
  - в) артериального
  - г) наружного
40. При кровотечении в грудную полость:
- а) положить грелку на грудь
  - б) положить холод на грудь
  - в) сделать рассасывающий компресс
  - г) наложить пластырь с лекарством
41. Воздух в плевральной полости:
- а) гемоторакс
  - б) пневмоторакс
  - в) анасарка
  - г) асцит
42. Всего степеней ожогов:
- а) 3
  - б) 4
  - в) 2
  - г) 5
43. Всего степеней отморожений:
- а) 3
  - б) 4
  - в) 2
  - г) 5
44. При отравлениях рекомендуется прием активированного угля из расчета 1 таблетка на:
- а) 1 кг. веса
  - б) 10 кг. веса
  - в) 5 кг. веса
  - г) 15 кг. веса
45. При отравлениях промывание желудка повторяют:
- а) до 3-х раз
  - б) до 5-и раз
  - в) до 7-и раз
  - г) до чистых промывных вод
46. Виды одышки:
- а) патологическая
  - б) физиологическая
  - в) удушье
  - г) инспираторная
47. Виды патологического дыхания:
- а) физиологическое
  - б) инспираторное
  - в) Биота
  - г) экспираторное
48. Виды медицинской помощи:
- а) доврачебная
  - б) санитарная
  - в) первая медицинская помощь
  - г) оперативная
49. Пульс в норме равен:
- а) от 80-100 уд. в мин
  - б) от 40-60 уд. в мин
  - в) от 16-20 уд. в мин
  - г) от 60-80 уд. в мин
50. Основной признак приступа бронхиальной астмы:
- а) брадикардия
  - б) тахипное
  - в) инспираторная одышка
  - г) экспираторная одышка