

#ПЕРВЫЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- 10-12
- 12-15
- 30-32
- 28

#ВТОРОЙ ДОРОДОВЫЙ ПАТРОНАЖ ПРОВОДИТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- 30-32
- 32-40
- 26-28
- 36-38

#НА ПЕРВОМ ДОРОДОВОМ ПАТРОНАЖЕ ПРОВОДИТСЯ

- сбор анамнеза
- обучение уходу за новорожденным
- полное обследование женщины
- постановка на учет

#ЦЕЛЬЮ ВТОРОГО ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА БЕРЕМЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- подготовка женщины к достаточной лактации
- знакомство с семьей
- выяснение состояния здоровья отца ребенка
- обучение уходу за ребенком

#ЗНАКОМСТВО С СЕМЬЕЙ НА ПЕРВОМ ДОРОДОВОМ ПАТРОНАЖЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- изучение анамнеза заболеваний
- профилактику респираторных инфекций новорожденного
- выяснение предпочтений в духовной сфере
- профилактику генетической патологии

#ЭМБРИОПАТИИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВЛИЯНИИ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ ДО НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ

- 12
- 20
- 24
- 30

#ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ

- талон амбулаторного пациента (ф. 025-12/у)
- дневник работы врача общей практики (семейного врач (ф. 039/у-воп)
- медицинскую карту амбулаторного больного (ф. 025/у-04)
- талон на прием к врачу (ф. 024-4/у-88)

**#РЕПРОДУКТИВНЫМ ВОЗРАСТОМ У ЖЕНЩИНЫ СЧИТАЮТ ВОЗРАСТ**

- от 15 до 50 лет
- от 15 до 20 лет
- от 15 до 40 лет
- от 15 до 30 лет

**#БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1 раз в месяц
- 2 раза в триместр
- 1 раз в 2 недели
- 1 раз в неделю

**#ЗДОРОВАЯ БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА ТЕРАПЕВТОМ**

- 2 раза за беременность
- 2 раза в месяц
- 2 раза в триместр
- 1 раз в 2 месяца

**#КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДИТСЯ**

- 3 раза за беременность
- 1 раз в месяц
- 2 раза в месяц
- 1 раз в 2 месяца

**#КРАТНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКОВ НА ГОНОКОККИ У БЕРЕМЕННЫХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 3
- 1
- 2
- 4

**#КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ УЗИ С ЦЕЛЮ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТАВЛЯЕТ**

- трижды в I, II и III триместрах беременности
- однократно во II триместре
- однократно в I триместре
- по строгим показаниям

**#ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ**

- только при наличии показаний
- при каждом посещении
- через одно посещение
- через два посещения

**#ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ОТПУСКА В ДНЯХ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ СОСТАВЛЯЕТ**

- 70
- 56
- 50
- 74

## #ОСНОВНАЯ РОЛЬ АКУШЕРКИ В СИСТЕМЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- борьбе с материнской и перинатальной заболеваемостью и смертностью
- оказании помощи, связанной с рождением ребенка
- оказании помощи только женщине
- оказании помощи всей семье

## #ФЛЮОРОГРАФИЯ ЛЕГКИХ У БЕРЕМЕННЫХ

- проводится, если есть подозрения на опухолевидные разрастания в верхних дыхательных путях, пневмонию, туберкулез, жалобы на инородное тело в легких
- назначается в первой и второй половине беременности
- назначается однократно при постановке на учет
- назначается трижды за беременность

## #МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ВОПРОСЫ О

- профессиональном долге медицинских работников
- внутреннем духовном мире человека
- формах человеческого сознания
- морали поведения

## #ОСМОТР ОФТАЛЬМОЛОГА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМ

- всем женщинам
- только женщинам с конъюнктивитом
- только женщинам после оперативной коррекции зрения
- женщинам, обращающимся по желанию

## #БЕРЕМЕННАЯ ДОЛЖНА ВСТАТЬ НА УЧЕТ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- 12
- 14
- 16
- 20

## #К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОТНОСИТСЯ

- увеличение объема циркулирующей крови
- понижение количества эритроцитов
- повышение количества лейкоцитов
- понижение количества тромбоцитов

## #БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ПРИЗНАКОВ

- вероятных
- предположительных
- сомнительных
- достоверных

## #ПОЯВЛЕНИЕ МОЛОЗИВА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ПРИЗНАКОВ БЕРЕМЕННОСТИ

- вероятных
- предположительных
- сомнительных
- достоверных

### #ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- размягчением перешейка матки
- размягчением тела матки
- сокращением матки при пальпации
- асимметрией матки

### #ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- асимметрии матки
- усиленном перегибе матки кпереди
- размягчении перешейка матки
- сокращении матки при пальпации

### #ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ ОСНОВАН НА РЕАКЦИИ МЕЖДУ

- хорионическим гонадотропином в моче и антисывороткой
- прогестероном в крови и антисывороткой
- эстрогеном и антисывороткой
- плацентарным лактогеном и антисывороткой

### #ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 36 НЕДЕЛЬ ДНО МАТКИ

- достигает мечевидного отростка
- на уровне пупка
- на середине расстояния между пупком и лоном
- на середине расстояния между пупком и мечевидным отростком

### #ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДАТЫ РОДОВ У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ К ДАТЕ ПЕРВОГО ШЕВЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИБАВИТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ

- 20
- 16
- 18
- 22

### #СИНТЕЗ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА ПРОИСХОДИТ В

- синцитиотрофобласте
- надпочечниках
- гипофизе
- яичниках

### #НАЧАЛО БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЕТСЯ С МОМЕНТА

- оплодотворения яйцеклетки
- имплантации бластоцисты
- деления зиготы
- продвижения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе

### #РАБОЧЕЕ МЕСТО ЗА ЖЕНЩИНОЙ СОХРАНЯЕТСЯ

- в течение трех лет после родов
- в течение года после родов
- на период декретного отпуска
- в течение пяти лет после родов

#### #УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПОКАЗАНО ПРИ

- несоответствии размеров матки и гестационного срока
- миоме матки
- угрозе прерывания беременности
- яичниковых новообразованиях

#### #РАСТЯЖКИ НА КОЖЕ У БЕРЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О

- недостаточной эластичности кожи
- пониженной сопротивляемости организма
- достоверности беременности
- избытке веса

#### #СРОК GESTАЦИИ, ПРИ КОТОРОМ ПЛОД ДОСТИГАЕТ ДЛИНЫ 35 CM И МАССЫ 1000 Г В НЕДЕЛЯХ

- 28
- 26
- 35
- 30

#### #КРОМЕ ЯИЧНИКОВ, ПРОГЕСТЕРОН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ТАКЖЕ

- плацентой
- гипофизом
- гипоталамусом
- щитовидной железой

#### #ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОНИЦАЕМОСТИ СТЕНОК СОСУДОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- повышение
- некоторое понижение
- существенное понижение
- остается без изменений

#### #КАЖДАЯ ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА ТРИЖДЫ ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ СДАЕТ

- кровь на гемоглобин, СОЭ и лейкоциты
- кровь на группу и резус-фактор
- мазки на скрытые инфекции
- мазки на гормональную угрозу

#### #ТИПИЧНЫЕ ЖАЛОБЫ У БЕРЕМЕННОЙ В I ТРИМЕСТРЕ

- тошнота и изменение вкуса
- головные боли и ухудшение зрения
- шевеление плода
- отеки

#### #СВЕРТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРОВИ К КОНЦУ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- повышением
- незначительным понижением
- остаются без изменений
- значительным понижением

## #ПРОГЕСТЕРОНОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- оксипрогестеронакапронат
- оксибутират натрия
- прогестерон
- профази

## #ЖЕНСКИЙ ТАЗ СОСТОИТ ИЗ КОСТЕЙ

- двух тазовых, крестца и копчика
- трех подвздошных
- двух лобковых
- двух седалищных

## #К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ОТНОСИТСЯ

- матка
- уретра
- клитор
- бартолиновые железы

## #НАРУЖНЫЙ ЗЕВ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ ИМЕЕТ ФОРМУ

- точечную
- щелевидную
- т-образную
- серповидную

## #ПРОГЕСТЕРОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В

- яичнике
- гипоталамусе
- гипофизе
- матке

## #СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ПОКРЫТА ЭПИТЕЛИЕМ

- цилиндрическим мерцательным
- зародышевым
- кубическим
- многослойным плоским

## #ФОРМА ШЕЙКИ МАТКИ НЕРОЖАВШЕЙ ЖЕНЩИНЫ

- коническая
- цилиндрическая
- призматическая
- шарообразная

## #ЭПИТЕЛИЙ, ВЫСТИЛАЮЩИЙ ВЛАГАЛИЩЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- многослойный плоский
- цилиндрический
- кубический
- призматический мерцательный

#### #БАРТОЛИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТСЯ К

- наружным половым органам женщин
- железам внутренней секреции женщин
- внутренним половым органам женщин
- железам внутренней секреции мужчин

#### #РЕАКЦИЯ ВЛАГАЛИЩНОЙ СРЕДЫ В НОРМЕ

- кислая
- нейтральная
- слабощелочная
- резкощелочная

#### #ОСНОВНОЙ СЛОЙ СЛИЗИСТОЙ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- базальный
- висцеральный
- корковый
- ворсинчатый

#### #НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- периметрий
- параметрий
- миометрий
- эндометрий

#### #ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ПРОИСХОДИТ

- в маточной трубе
- в яичнике
- в матке
- в брюшной полости

#### #ПАРАМЕТРАЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА ВЫПОЛНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО

- между листками широких связок
- вокруг мочевого пузыря
- вокруг дугласова углубления
- вокруг прямой кишки

#### #МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ПОДХОДИТ К МАТКЕ НА УРОВНЕ

- внутреннего зева
- наружного зева
- трубного угла
- дна матки

#### #ЯИЧНИКОВАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ

- брюшной аорты
- маточной артерии
- подвздошной артерии
- срамной артерии

#### #БАРТОЛИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В

- толще больших половых губ
- толще малых половых губ
- влагалище
- шейке матки

#НОРМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПУПОВИНЫ РАВНА В САНТИМЕТРАХ

- 50
- 30
- 70
- 40

#ПУПОВИНА ВКЛЮЧАЕТ

- две артерии и одну вену
- две вены и одну артерию
- одну вену и одну артерию
- две вены и две артерии

#ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ДО СРОКА В НЕДЕЛЯХ

- 12
- 10
- 16
- 14

#ЖЕЛТЫМ ТЕЛОМ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- прогестерон
- пролактин
- окситоцин
- вазопрессин

#ОВУЛЯЦИЯ ПРИ 28 ДНЕВНОМ ЦИКЛЕ У ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИСХОДИТ В ДНЯХ

- 12-16
- 3-5
- 6-9
- 8-10

#ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН СТИМУЛИРУЕТ СЕКРЕЦИЮ

- прогестерона
- эстрогенов
- андрогенов
- эстриола

#В НОРМЕ СОЗРЕВАНИЕ ШЕЙКИ К РОДАМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОИСХОДИТ, НАЧИНАЯ С НЕДЕЛИ

- 38
- 36
- 35
- 34

#ВО ВРЕМЯ СХВАТКИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИСХОДИТ

- ретракция, контракция мышечных волокон
- расслабление миометрия
- неравномерное сокращение миометрия
- сокращение нижнего сегмента матки



### #ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 3 ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ

- наличия признаков отделения плаценты
- состояния плода
- продолжительности 1 и 2 периода родов
- величины и размеров последа

### #ДВИЖЕНИЕ, СОВЕРШАЕМОЕ ГОЛОВКОЙ ПЛОДА В УЗКОЙ ПЛОСКОСТИ МАЛОГО ТАЗА ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- внутренний поворот
- разгибание
- сгибание
- дополнительное разгибание

### #ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО ПОЛНОГО

- раскрытия маточного зева
- раскрытия внутреннего зева
- излития околоплодных вод
- сглаживания шейки матки

### #ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО

- рождения последа
- рождения плода
- рождения плаценты
- излития околоплодных вод

### #ГОРМОН, СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

- окситоцин
- фолликулин
- питуитрин
- тестостерон

### #ТАЗОВАЯ КОСТЬ СОСТОИТ ИЗ КОСТЕЙ

- подвздошной, седалищной и лобковой
- крестца, копчика
- крестцового мыса, лобковой
- бедренной, симфиза

### #НЕНАРКОТИЧЕСКИМ АНАЛЬГЕТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- метамизол натрия (анальгин)
- морфина гидрохлорид
- тримеперидин (промедол)
- омнопон

### #НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ

- вводятся только по назначению врача и подлежат строгому учету
- не угнетают дыхательный центр
- не применяются для обезболивания родов
- не применяют после кесарева сечения

**#БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ**

- от медицинских работников женской консультации
- от знакомых
- из интернет-ресурсов
- из литературных источников

**#ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СХВАТКАМИ В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ**

- 2-3
- 4-5
- 6-7
- 8-9

**#ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ АКУШЕРКЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ БЕСЕДУ О**

- половой гигиене во время беременности
- хромосомных заболеваниях
- пороках развития плода
- заболеваниях детского возраст

**#СВОЕВРЕМЕННОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРОИСХОДИТ ПРИ**

- полном или почти полном открытии маточного зева
- образовании пояса прилегания
- появлении потуг
- опущении головки плода в полость малого таза

**#ПРИЗНАКОМ НАЧАЛА ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- регулярное сокращение матки
- усиление шевеления плода
- отхождение околоплодных вод
- появление кровянисто-слизистых выделений из половых путей

**#ПРИЗНАКОМ ПРЕДВЕСТНИКОВ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- структурное изменение шейки матки
- отхождение вод
- кровотечение
- редкие схватки

**#СВОЕВРЕМЕННЫМ ДЛЯ ПЕРВЫХ РОДОВ СЧИТАЕТСЯ ОТХОЖДЕНИЕ ВОД ПРИ РАСКРЫТИИ ШЕЙКИ В САНТИМЕТРАХ**

- 7-8
- 3-4
- 5-6
- 1-2

**#ВТОРАЯ ФАЗА ПЕРИОДА РАСКРЫТИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- активной
- латентной
- транзиторной
- прелиминарной

## #НАЧАЛОМ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

- появление регулярных схваток и сглаживание шейки матки
- прижатие головки к входу в малый таз
- излитие околоплодных вод шейки
- отхождение слизистой пробки

## #ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СХВАТОК В ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 60
- 50
- 40
- 25

## #СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

- создает защитную подушку для эмбриона
- способствует питанию плода
- обеспечивает иммунологическую защиту
- ограничивает свободу движений эмбриона

## #УКОРОЧЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- контракция
- дистракция
- регургитация
- ретракция

## #СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МИОМЕТРИЯ СТИМУЛИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ ВЫРАБОТКИ

- простагландинов
- прогестерона
- партусистена
- бромокриптина (парлодел)

## #ОБЪЕМ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ (ОЦК) ПРИ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

- увеличивается умеренно
- уменьшается незначительно
- резко увеличивается
- резко уменьшается

## #ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УКРЕПЛЕНИЮ СВЯЗИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ

- осторожно берет на руки, гладит, целует
- держит ребенка на некотором расстоянии от себя
- пытается командовать ребенком
- негативно высказывается в его адрес

## #ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И РЕБЕНКОМ АКУШЕРКА ДОЛЖНА ПРИЛОЖИТЬ РЕБЕНКА К ГРУДИ

- сразу после родов
- через 1 час
- через 2 час
- через 1 день

**#ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ  
СОСТАВЛЯЕТ В КИЛОГРАММАХ**

- 10-12
- 5-6
- 7-8
- 13-14

**#В РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ АКУШЕРКИ НА САНИТАРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНУЮ  
РАБОТУ В МЕСЯЦ ОТВОДИТСЯ ЧАСОВ**

- 4
- 2
- 3
- 1

**#К ПИЩЕ, НАИБОЛЕЕ БОГАТОЙ УГЛЕВОДАМИ ОТНОСЯТСЯ**

- мучные изделия
- ) мясо
- молочные продукты
- овощи

**#СРОКИ ВЫПИСКИ ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ**

- состоянием здоровья матери и ребенка
- только здоровьем матери
- только здоровьем ребенка
- массой тела ребенка

**#РОДСТВЕННИКИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПРИ РОДАХ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ В**

- сменной одежде, халате, маске, обуви и бахилах
- сменной одежде и сменной обуви
- обычной одежде и сменной обуви
- в обычной одежде

**#ЛЕКЦИЯ О ВЛИЯНИИ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПЛОД ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ  
ИНФОРМАЦИЮ О**

- вреде курения, алкоголя и наркотиков
- режиме дня
- гигиене
- питании

**#РЕКОМЕНДУЕМАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ВО ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ В КАЛОРИЯХ**

- 2500-3000
- 1000-1500
- 1500-2000
- 4000-4500

**#РАССТРОЙСТВО ЭМОЦИЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- апатией
- амнезией
- анорексией
- булимией

#### #ПРОИЗВОЛЬНЫЙ СФИНКТЕР ПРЯМОЙ КИШКИ ОБРАЗОВАН

- мышцами диафрагмы таза
- круговым слоем мышц стенки прямой кишки
- продольным слоем мышц стенки прямой кишки
- подвздошно-поясничной мышцей

#### #НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ СФИНКТЕР ПРЯМОЙ КИШКИ ОБРАЗОВАН

- круговым слоем мышц стенки прямой кишки
- подвздошно-поясничной мышцей
- продольным слоем мышц стенки прямой кишки
- мышцами диафрагмы таза

#### #ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА В-12 РАЗВИВАЕТСЯ

- анемия
- рахит
- цинга
- дерматоз

#### #ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЖЕНЩИН ПРИЛЕЖИТ К

- шейке матки и влагалищу
- прямой кишке
- сигмовидной кишке
- слепой кишке

#### #МАССА МАТКИ В ГРАММАХ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- 40-50
- 30-40
- 50-60
- 60-70

#### #ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СООТНОШЕНИЕМ

- различных видов лейкоцитов
- различных видов клеток крови
- крови и плазмы
- количество крови и массы тела

#### #БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИНЫ В ДНЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СРЕДНЕМ

- 280
- 220
- 300
- 260

#### #СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- нарушение обоняния
- отсутствие менструации
- увеличение молочных желез
- увеличение матки

**#ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- увеличение матки
- появление пигментации
- нарушение обоняния
- тошнота

**#ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- выслушивание сердцебиения плода
- рвота
- размягчение перешейка матки
- отсутствие менструаций

**#ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ ПУПКА ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 24
- 20
- 28
- 16

**#ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ЛОБКОМ И ПУПКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ**

- 16
- 22
- 28
- 24

**#СИМПТОМ РАЗМЯГЧЕНИЯ ОБЛАСТИ ПЕРЕШЕЙКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ**

- Горвица-Гегара
- Пискачека
- Снегирева
- Отта

**#СИМПТОМ НЕРОВНОСТЕЙ КОНТУРОВ МАТКИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ**

- Пискачека
- Снегирева
- Горвица-Гегара
- Отта

**#СИМПТОМ ЛЕГКОЙ ВОЗБУДИМОСТИ МАТКИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ НАЗВАН ПРИЗНАКОМ**

- Снегирева
- Горвица-Гегара
- Пискачека
- Отта

**#НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЮТ**

- 25-28-31-20
- 22-25-28-18
- 28-29-32-15
- 20-23-25-17

#### #ОТНОШЕНИЕ ОСИ ПЛОДА К ОСИ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- положение
- предлежание
- позиция
- вид

#### #ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К БОКОВЫМ СТЕНКАМ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- позиция
- вид
- предлежание
- вставление

#### #ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ МАТКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- вид
- позиция
- предлежание
- членорасположение

#### #ОТНОШЕНИЕ КРУПНОЙ ЧАСТИ ПЛОДА КО ВХОДУ В ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ

- предлежание
- положение
- вид
- позиция

#### #ОТНОШЕНИЕ СТРЕЛОВИДНОГО ШВА ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ТАЗА НАЗЫВАЕТСЯ

- вставление головки
- предлежание головки
- разгибание головки
- сгибание головки

#### #ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ

- высоту стояния дна матки
- предлежащую часть
- позицию и вид плода
- вставление головки

#### #ВТОРОЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ

- положение, позицию, вид плода
- предлежащую часть
- высоту стояния дна матки
- вставление головки

#### #ТРЕТИЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТ

- предлежащую часть
- позицию
- вид
- вставление головки

#РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАИБОЛЕЕ УДАЛЕННЫМИ ТОЧКАМИ ГРЕБНЕЙ  
ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

-28-29

-30-32

-25-26

-20-21

#РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ ЛОБКОВОГО СИМФИЗА И  
НАДКРЕСТЦОВОЙ ЯМКОЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

-20-21

-25-26

-28-29

-30-31

#В НОРМЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕВЕРХНИМИ ОСТЯМИ  
ПОДВЗДОШНЫХ КОСТЕЙ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

-25-26

-30-31

-20-21

-28-29

#ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОБА МОЧИ НА БЕРЕМЕННОСТЬ ОСНОВАНА НА  
ВЫЯВЛЕНИИ

-хорионического гонадотропина

-белка

-ацетона

-лейкоцитов

#ПРИЗНАК ПИСКАЧЕКА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

-вероятных признаков беременности

-сомнительных признаков беременности

-достоверных признаков беременности

-предположительных признаков беременности

#ИСТИННАЯ КОНЪЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ РАВНЯЕТСЯ

-11

-10

-9

-13

#РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИЖНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАИБОЛЕЕ  
ВЫДАЮЩЕЙСЯ ТОЧКОЙ МЫСА НАЗЫВАЕТСЯ КОНЪЮГАТОЙ

-диагональной

-истинной

-анатомической

-наружной

#РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЕРХНИМ КРАЕМ СИМФИЗА И НАДКРЕСТЦОВОЙ  
ЯМКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

-наружной конъюгатой

-индексом Соловьева

-истинной конъюгатой

-диагональной конъюгатой



#ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНЪЮГАТА НОРМАЛЬНОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ РАВНЯЕТСЯ

- 12,5-13
- 11-11,5
- 9-10
- 20-21

#ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НАРУЖНОЙ КОНЪЮГАТЫ ТАЗА ЖЕНЩИНА ЛЕЖИТ

- на боку с согнутой нижележащей ногой
- на боку с согнутой вышележащей ногой
- на спине с вытянутыми ногами
- на спине с согнутыми ногами

#ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ПЛОДА ПО МЕТОДУ ЖОРДАНИЯ НЕОБХОДИМО

- умножить высоту стояния дна матки на окружность живота
- разделить окружность живота на высоту стояния дна матки
- от длины окружности живота отнять высоту стояния дна матки
- к окружности живота прибавить высоту стояния дна матки

#ПОВТОРНORODЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

- 18
- 14
- 20
- 22

#ДНО МАТКИ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ ПУПКОМ И МЕЧЕВИДНЫМ ОТРОСТКОМ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- 32
- 34
- 36
- 26

#ПЕРВОРОДЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ ОЩУЩАТЬ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ЧАЩЕ ВСЕГО НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

- 20
- 24
- 22
- 26

#ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ И ВИД ПЛОДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО НОМЕР

- 2
- 1
- 3
- 4

#ПРИЗНАК ГОРВИЦА-ГЕГАРА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- вероятных признаков беременности
- сомнительных признаков беременности
- достоверных признаков беременности
- предположительных признаков беременности

#ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНВОЛЮЦИИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ РОДОВ В НЕДЕЛЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- 6
- 2
- 4
- 3

#СРОКИ ЗАКРЫТИЯ ВНУТРЕННЕГО ШЕЕЧНОГО ЗЕВА ПОСЛЕ РОДОВ В ДНЯХ СОСТАВЛЯЕТ

- 7
- 3
- 14
- 20

#ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕНСТРУАЦИЙ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- вероятных признаков беременности
- предположительных признаков беременности
- сомнительных признаков беременности
- достоверных признаков беременности

#ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РОДИЛЬНИЦЕЙ ПОСЛЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ В ЧАСАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 2
- 1
- 6
- 24

#ЛОХИИ ОСТАЮТСЯ ЧИСТО КРОВЯНИСТЫМИ В ДНЯХ

- 2-3
- 4-5
- 6-8
- 8-10

#ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КРОВОПОТЕРИ В РОДАХ В ПРОЦЕНТАХ ОТ МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ

- 0,5%
- 0,6%
- 1%
- 5%

#ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРИЗНАКА ОТДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДА ПО МЕТОДУ ШРЕДЕРА СЛЕДУЕТ

- определить изменение стояния высоты дна матки
- надавить ребром ладони над лобком
- проверить пульсацию сосудов пуповины
- предложить роженице подышать

#НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ РОДАХ ПЕРЕСЕКАТЬ ПУПОВИНУ

- после прекращения пульсации сосудов пуповины
- сразу после рождения ребенка
- после отделения последа
- после кормления ребенка

## #ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ЖИВОТА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРОИЗВОДИТСЯ

- на уровне пупка
- на уровне дна матки
- в положении стоя
- в положении лежа на боку

## #МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ НАБЛЮДАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

- 36
- 38
- 40
- 32

## #ВСТАВЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ

- стреловидного шва к мысу и симфизу
- малого родничка к передней или задней стенке таза
- малого родничка к правой или левой стенке таза
- большого родничка к правой или левой стенке таза

## #АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН В КРОВИ БЕРЕМЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА СРОКЕ В НЕДЕЛЯХ

- 15-16
- 5-6
- 9-10
- 19-20

## #ПРИ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ГОРМОН

- альфа-фетопротеин
- плацентарный лактоген
- эстриол
- прогестерон

## #ПРИ АМНИОСКОПИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- цвет околоплодных вод
- уродство плода
- биомеханический состав вод
- наличие многоплодной беременности

## #ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИБАВКА ЗА НЕДЕЛЮ В ГРАММАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 300-400
- 100-200
- 500-600
- 700-800

## #ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- судорожное сокращение икроножных мышц
- головная боль
- тошнота
- учащенное мочеиспускание

## #ПРИЗНАКОМ «ЗРЕЛОЙ» ШЕЙКИ МАТКИ НАКАНУНЕ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- укорочение шейки до 1 см
- длина шейки 3 см
- отклонение шейки кзади
- проходимость наружного зева для кончика пальца

## #ДЕКСАМЕТАЗОН ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- для профилактики респираторных расстройств новорожденного
- для профилактики предлежания плаценты
- для профилактики кровотечения во втором периоде родов
- для лечения аномалий родовых сил

## #ОСМОТР РОДОВЫХ ПУТЕЙ ПОСЛЕ РОДОВ ПРОВОДИТСЯ

- всем женщинам
- только первородящим
- только повторнородящим
- только женщинам из группы риска

## #УДЛИНЕНИЕ НАРУЖНОГО ОТРЕЗКА ПУПОВИНЫ НА 10 СМ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- Альфельда
- Шредера
- Кюстнера-Чукалова
- Гентера

## #РОДОВЫЕ ПУТИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

- костный таз, матку, влагалище, мышцы тазового дна
- матку, мышцы тазового дна, пристеночные мышцы таза
- матку, влагалище, мышцы тазового дна
- тело матки, нижний сегмент матки, влагалище

## #ПЛОСКОСТЬ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ

- верхний край симфиза, безымянные линии, крестцовый мыс
- середицу внутренней поверхности симфиза, безымянные линии, крестцовый мыс
- верхний край симфиза, безымянные линии, первый поясничный позвонок
- нижний край симфиза, подвздошные ямки, крестцовый мыс

## #ЧЕРЕЗ СЕДАЛИЩНЫЕ БУГРЫ ПРОХОДИТ

- поперечный размер плоскости выхода из малого таза
- поперечный размер плоскости узкой части полости малого таза
- поперечный размер плоскости широкой части полости малого таза
- прямой размер плоскости узкой части полости малого таза

## #БИОМЕХАНИЗМ РОДОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- сгибание и внутренний поворот головки
- запрокидывание ручек
- дополнительный внутренний поворот плечиков
- запрокидывание головки кзади

## #ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРИОДОМ

- изгнания
- раскрытия
- прелиминарным
- предвестниковым

## #ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА

- полного раскрытия шейки матки
- начала потужных схваток
- отхождения вод
- появления схваток через 3 минуты по 40 сек

## #АУСКУЛЬТАЦИЯ ПЛОДА ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПРИ ГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРОВОДИТСЯ

- чуть ниже пупка со стороны позиции
- над лобком
- выше пупка
- на уровне пупка

## #ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ВТОРЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- внутренний поворот головки
- сгибание головки
- разгибание головки
- дополнительное сгибание головки

## #ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- малый родничок
- большой родничок
- подзатылочная ямка
- переносица

## #ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- сгибание головки
- разгибание головки
- дополнительное сгибание головки
- внутренний поворот головки

## #ТОЧКА, ВОКРУГ КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ РАЗГИБАНИЕ ИЛИ СГИБАНИЕ ГОЛОВКИ ПРИ БИОМЕХАНИЗМЕ РОДОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- точкой фиксации
- проводной
- ведущей
- точкой отсчета

## #ВО ВРЕМЯ ПОТУГ ХАРАКТЕРНО

- повышение внутрибрюшного давления
- уменьшение внутрибрюшного давления
- расслабление мышц брюшного пресса
- расслабление мышц тазового дна

#### #ПОД ПОЗИЦИЕЙ ПЛОДА ПОНИМАЕТСЯ

- отношение спинки плода к боковым стенкам матки
- отношение головки плода к входу в таз
- отношение оси плода к оси (длиннику) матки
- взаимоотношение различных частей плода

#### #В НОРМЕ ПОТУГИ ДОЛЖНЫ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ГОЛОВКИ ПЛОДА

- не выше узкой части полости малого таза
- в широкой полости таза
- в плоскости входа в малый таз
- над входом в малый таз

#### #ПРАВЫМ КОСЫМ РАЗМЕРОМ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ НАЗЫВАЕТСЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ

- правым крестцово-подвздошным сочленением и левым подвздошно-лобковым бугорком
- верхним краем лобкового симфиза и мысом
- левым крестцово-подвздошным сочленением и правым подвздошно-лобковым бугорком
- наиболее отдаленными точками безымянных линий

#### #ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ УЗКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 10,5
- 11
- 13
- 12,5

#### #ЛЕВЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 12
- 11
- 13
- 10,5

#### #ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ШИРОКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 12,5
- 11
- 13
- 10,5

#### #ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 11
- 12,5
- 13
- 9

#ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВЫСЛУШИВАНИЯМИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПРИ ЦЕЛОМ ПЛОДНОМ ПУЗЫРЕ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

-15-20

-20-30

-5-10

-30-40

#БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

-теменными буграми

-границей волосистой части лба и затылочным бугром

-передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой

-наиболее отдаленными точками венечного шва

#ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

-серединой большого родничка и подъязычной костью

-передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой

-теменными буграми

-затылочным бугром и подбородком

#ПРЯМОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

-переносицей и затылочным бугром

-передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой

-границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой

-серединой большого родничка и подъязычной костью

#МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

-9,5

-10,5

-12

-11

#РАССТОЯНИЕ ОТ ПЕРЕНОСИЦЫ ДО ЗАТЫЛОЧНОГО БУГРА ГОЛОВКИ ПЛОДА НАЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ

-прямым

-средним косым

-малым косым

-вертикальным

#РАССТОЯНИЕ ОТ СЕРЕДИНЫ БОЛЬШОГО РОДНИЧКА ГОЛОВКИ ПЛОДА ДО ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ

-вертикальным

-малым косым

-прямым

-большим косым

#МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

-наиболее отдаленными точками венечного шва

-границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой

-теменными буграми

-переносицей и затылочным бугром

## #БОЛЬШОЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- подбородком и затылочным бугром
- границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой
- наиболее отдаленными точками венечного шва
- теменными буграми

## #МАЛЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 8
- 11
- 13
- 12

## #МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА ИЗМЕРЯЕТСЯ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ

- передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой
- переносицей и затылочным бугром
- серединой большого родничка и подъязычной костью
- затылочным бугром и подбородком

## #ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ

- малым косым размером
- малым поперечным размером
- большим поперечным размером
- большим косым размером

## #ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ

- средним косым размером
- малым косым размером
- большим косым размером
- прямым размером

## #РОЖЕНИЦЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТУЖИТЬСЯ

- при прорезывании теменных бугров
- при наружном повороте головки
- после рождения головки
- при положительных признаках отделения последа

## #БИОМЕХАНИЗМОМ РОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- совокупность движений плода по родовому каналу
- врезывание головки плода
- поворот плода «на ножку»
- внутренний поворот головки

## #ЗАЩИТУ ПРОМЕЖНОСТИ ПРОВОДЯТ В ПЕРИОДЕ

- изгнания плода
- раннем послеродовом
- рождения последа
- раскрытия шейки матки



#### #ГРАНИЦАМИ ПЛОСКОСТИ ВХОДА В МАЛЫЙ ТАЗ ЯВЛЯЮТСЯ

- верхний край симфиза, безымянная линия, мыс
- проекции вертлужных впадин, середина крестца
- низ симфиза, седалищные ости, мыс
- низ симфиза, седалищные бугры, край копчика

#### #К НАРУЖНОМУ СЛОЮ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ АППАРАТУ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ОТНОСЯТСЯ МЫШЦЫ

- седалищно-пещеристые
- лобково-копчиковые
- подвздошно-копчиковые
- седалищно-копчиковые

#### #К ФИКСИРУЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ

- крестцово-маточные
- широкие
- воронко-тазовые
- круглые

#### #К ПОДВЕШИВАЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ

- круглые
- крестцово-маточные
- пузырно-маточные
- кардинальные

#### #МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ

- внутренней подвздошной артерии
- аорты
- половой артерии
- наружной подвздошной артерии

#### #ПЯТЫМ МОМЕНТОМ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- освобождение плечевого пояса и рождение туловища
- бережное выведение головки вне потуг
- регулирование потуг
- рассечение промежности

#### #ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛИВШЕГОСЯ ПОСЛЕДА ПРИМЕНЯЮТ СПОСОБ

- Абуладзе
- Шредера
- Довженко
- Малиновского

#### #ПРИ ОСМОТРЕ ПОСЛЕДА НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ЦЕЛОСТНОСТИ

- плаценты и оболочек
- только долек плаценты
- только оболочек
- краев плаценты

#ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ВЫСЛУШИВАНИЯМИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА ПОСЛЕ ОТХОЖДЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ В МИНУТАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 5-10
- 15-20
- 20-30
- 30-40

#ЧАСТОТА СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА В НОРМЕ В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- 120-160
- 100-110
- 170-180
- 105-110

#ПОТУГИ ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПОВТОРЯЮТСЯ КАЖДЫЕ 2-3 МИНУТЫ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В СЕКУНДАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 50-60
- 30-40
- 20-30
- 15-20

#ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РОДОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

- полным раскрытием маточного зева
- рождением ребенка
- рождением последа
- прорезыванием головки плода

#АКУШЕРСКОЕ ПОСОБИЕ В РОДАХ НАЧИНАЮТ ОКАЗЫВАТЬ

- при прорезывании головки плода
- после рождения головки плода
- после рождения плечиков плода
- при угрозе разрыва промежности

#СПОСОБ АБУЛАДЗЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

- наличии признаков отделения плаценты и отсутствии самостоятельного рождения последа
- кровотечении из влагалища
- задержки в матке дольки плаценты
- задержки в матке оболочек

#ПОСЛЕДОВЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ

- рождения плода
- отделения плаценты
- пересечения пуповины плода
- рождения плечиков

#ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО

- темпу сглаживания и раскрытия шейки матки
- частоте и продолжительности схваток
- времени излития околоплодных вод
- длительности родов

**#ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ТРЕТЬИМ МОМЕНТОМ  
БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- разгибание головки
- сгибание головки
- внутренний поворот головки
- внутренний поворот плечиков

**#МАЛЫЙ РОДНИЧОК ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ**

- переднем виде затылочного предлежания
- заднем виде затылочного предлежания
- лобном предлежании
- переднетеменном предлежании

**#ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА РОДОВ ЗАВИСИТ ОТ**

- наличия признаков отделения плаценты
- длительности первого периода родов
- длительности второго периода родов
- длительности безводного периода

**#ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА НА ПУПОВИНУ НАКЛАДЫВАЮТ ЗАЖИМЫ  
КОХЕРА В КОЛИЧЕСТВЕ**

- 3
- 1
- 2

**#К ПОКАЗАТЕЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА ОТНОСИТСЯ**

- перинатальная смертность
- младенческая смертность
- летальность
- повозрастная смертность в детском возрасте

**#ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ В АКУШЕРСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- женская консультация
- станция скорой медицинской помощи
- диспансер
- поликлиника

**#ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И  
РОДАМ МОЖЕТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ**

- законодательством РФ, на региональном уровне может увеличиваться
- только законодательством РФ
- только законодательными актами субъектов РФ
- законодательством РФ, на региональном уровне уменьшается

**#ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ СОСТАВЛЯЕТ**

- 140 календарных дней
- 170 календарных дней
- 120 календарных дней
- 150 календарных дней

**#МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- специализированная
- медико-социальная
- паллиативная
- квалифицированная

**#В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА ЖЕНЩИНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА**

- 3 лет
- 1.5 года
- 1.5 лет
- 1 года

**#ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ**

- члену семьи, кто фактически будет ухаживать за ребенком
- отцу ребенка
- близкому родственнику
- только матери ребенка

**#ПРИ НАБЛЮДЕНИИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ КАЖДАЯ БЕРЕМЕННАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ОСМОТРЕНА**

- терапевтом, стоматологом, отоларингологом, офтальмологом
- терапевтом, хирургом
- хирургом, венерологом
- лор-врачом, инфекционистом

**#ЖЕНЩИНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДОЛЖНА ПОСЕЩАТЬ ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ**

- 1 раз в 2 недели
- 1 раз в месяц
- 1 раз в 10 дней
- 1 раз в 2 месяца

**#РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ (В НЕДЕЛЯХ)**

- 30
- 28
- 34
- 38

**#КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА СИФИЛИС В ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 3
- 2
- 4
- 1

#ДОРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ПРИ МНОГОПЛОДИИ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ С

-28

-30

-34

-38

#АКУШЕРКА, ЕСЛИ БЕРЕМЕННАЯ НЕ ПРИШЛА НА ПРИЕМ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, ПРОВОДИТ ПАТРОНАЖ

-в этот же или на следующий день

-в течение недели

-в течение месяца

-только по назначению врача

#НЕОБХОДИМО, ПРИ КАЖДОМ ПОСЕЩЕНИИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЬ

-взвешивание и тонометрию

-взвешивание и пельвиометрию

-осмотр в зеркалах

-бимануальное исследование

#АКУШЕРКА ИМЕЕТ ПРАВО

-оказывать акушерское пособие при физиологических родах

-оказывать акушерское пособие без врача при осложненных родах

-проводить ручное отделение и выделение последа

-проводить ручное обследование стенок полости матки

#ДОРОДОВЫЙ ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫДАЕТСЯ НА СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НЕДЕЛЯХ

-30

-26

-32

-27

#БЕРЕМЕННЫМ С ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОРОДОВЫЙ ОТПУСК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В ДНЯХ

-70

-56

-86

-84

#БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРОВОДИТСЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ НАЛИЧИИ

-Rh-конфликта

-столбняка

-дифтерии

-полиомиелита

### #30-НЕДЕЛЬНЫЙ СРОК БЕРЕМЕННОСТИ УТОЧНЯЮТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДНО МАТКИ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 36 НЕДЕЛЬ

- ультразвукового исследования
- рентгенологического метода
- амниоскопии
- электрокардиографии плода

### #ОКРУЖНОСТЬ 33 СМ ПРИ ДИАМЕТРЕ 10 СМ ИМЕЕТ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА

- средний косой
- прямой
- большой косой
- малый косой

### #ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- матка
- уретра
- клитор
- бартолиновая железа

### #РЕАКЦИЯ СРЕДЫ В ПОЛОСТИ МАТКИ

- щелочная
- кислая
- нейтральная
- слабокислая

### #ГЛУБОКИМ СВОДОМ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- задний
- передний
- правый боковой
- левый боковой

### #ПЛОДОВЫМИ ОБОЛОЧКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- ворсистая и водная
- децидуальная и водная
- децидуальная и ворсистая
- спонгиозная и компактная

### #ПРИДАТКАМИ МАТКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- маточные трубы и яичники
- шейка матки и яичники
- яичники и влагалище
- шейка матки и влагалище

### #МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗМА БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- определение зрелости шейки матки
- определение нахождения предлежащей части плода
- проведение пельвиометрии
- измерение окружности живота

## #ДЕЛЕНИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД НА ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ

- пояса соприкосновения
- контракционного кольца
- предлежащей пуповины
- оболочек плодного яйца

## #ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ

- рождения плода
- появления последовых схваток
- появления кровянистых выделений
- рождения последа

## #ВЫДЕЛЯЮТ ФАЗУ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ

- латентную
- активную
- пассивную
- торпидную

## #ГОРМОН, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ В ЖЕЛТОМ ТЕЛЕ

- прогестерон
- эстрадиол
- инсулин
- окситоцин

## #БЕРЕМЕННОЙ НЕОБХОДИМО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РОДАМ

- выбрать роддом и пройти курс дородовой подготовки
- послушать истории родов своих знакомых
- прочитать учебник акушерства для специалистов
- посетить несколько родов в родильном зале

## #БЕРЕМЕННОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ДИЕТЫ

- белково-витаминной
- с ограничением белковой пищи
- преимущественно углеводно-жировой
- с ограничением овощей, фруктов

## #ПРИМЕНЯЮТ С ЦЕЛЬЮ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ АНЕСТЕЗИЮ

- эпидуральную
- проводниковую
- внутрикостную
- парацервикальную

## #ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПЕРИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

- тримекаин
- триквилар
- трилен
- морфин

#### #МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- эпидуральная анестезия
- рефлексотерапия
- гидротерапия
- аудиоанальгезия

#### #НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- самомассаж
- эпидуральная анестезия
- ингаляционная анестезия
- проводниковая анестезия

#### #ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ БОЛЕЗНЕННОСТИ СХВАТОК ПРЕПАРАТЫ

- спазмолитики
- гемостатики
- антибиотики
- простагландины

#### #ГОМК – СОКРАЩЁННОЕ НАЗВНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

- гаммаоксимасляная кислота
- аминокапроновая кислота
- этамзилат натрия
- оксипрогестеронакапронат

#### #МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ СОН -ОТДЫХ ПОКАЗАН

- при патологическом прелиминарном периоде
- во втором периоде родов
- в раннем послеродовом периоде
- всем роженицам без исключения

#### #ПРЕДВЕСТНИКАМИ РОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- ложные схватки и опущение дна матки
- отхождение околоплодных вод
- частые мочеиспускания
- кровянистые выделения из половых путей

#### #ТРЕТИЙ ПЕРИОД РОДОВ НАЗЫВАЮТ

- последовым
- послеродовым
- прелиминарным
- предвестниковым

#### #ОТНОСЯТСЯ К ВНУТРЕННИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ ЖЕНЩИНЫ

- яичники, маточные трубы, матка, влагалище
- влагалище, матка, мочевого пузырь
- яичники, мочеиспускательный канал, матка
- матка, яичники, мочевого пузырь, влагалище

#### #НАИБОЛЕЕ БОГАТОЙ БЕЛКАМИ ПИЩЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- мясо
- крупы
- овощи
- мучные изделия



#### #РАННЯЯ ВЫПИСКА ИЗ РОДИЛЬНОГО ДОМА СПОСОБСТВУЕТ

- снижению заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи
- росту маститов у матери
- увеличению послеродовых осложнений
- уменьшению лактостаза

#### #МАССА МАТКИ У РОЖАВШИХ ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

- 80-90
- 60-70
- 70-80
- 90-100

#### #РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНА

- яичниками, маткой, маточными трубами, влагалищем, вульвой
- влагалищем, маткой, мочевым пузырем
- яичниками, мочеиспускательным каналом, маткой
- маткой, яичниками, прямой кишкой, влагалищем

#### #ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- наличие плода в полости матки
- отсутствие менструации
- увеличение размеров матки
- увеличение живота

#### #НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ФОРМОЙ ПОСЛЕРОДОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- эндометрит
- мастит
- перитонит
- тромбофлебит

#### #НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИСТИННОЙ КОНЬЮГАТЫ

- отнять 1,5-2 см от диагональной конъюгаты
- отнять 1,5-2 см от наружной конъюгаты
- прибавить 1,5-2 см к диагональной конъюгате
- отнять 9 см от диагональной конъюгаты

#### #ИСТИННУЮ КОНЬЮГАТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕМ С УЧЕТОМ РАЗМЕРА

- индекса Соловьева
- размера Франка
- диагональной конъюгаты
- наружной конъюгаты

#### #ПЕРЕД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЖИВОТ БЕРЕМЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ

- гелем, мазью
- эфиром
- спиртом
- йодонатом

#ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА:

- продольное, поперечное, косое
- косое и поперечное
- головное и тазовое
- переднее и заднее

#ПАТРОНАЖ, НА КОТОРОМ БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ ГОТОВЯТ К ДОСТАТОЧНОЙ ЛАКТАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- второй дородовый
- первый дородовый
- первичный врачебно-сестринский
- целевой патронаж

#СОВОКУПНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЕТ ПЛОД ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАЗ И РОДОВЫЕ ПУТИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- биомеханизмом родов
- асинклитизмом
- конфигурацией головки
- течением родов

#ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА КОНТРОЛИРУЮТСЯ

- после каждой потуги
- через каждые 15 минут
- через каждые 10 минут
- через каждые 5 минут

#ПРЯМОЙ РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ УЗКОЙ ЧАСТИ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 11,5
- 11
- 10,5
- 13

#ПРЯМО РАЗМЕР ПЛОСКОСТИ ВЫХОДА МАЛОГО ТАЗА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 9,5-11
- 12
- 12,5
- 11

#СРЕДНИЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ПЛОДА В САНТИМЕТРАХ СОСТАВЛЯЕТ

- 10
- 9,5
- 12
- 13,5

#ПЕРВЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- сгибание головки
- разгибание головки
- внутренний поворот затылком головки кпереди
- внутренний поворот головки затылком кзади

#ЧЕТВЕРТЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- внутренний поворот плечиков, наружный поворот головки
- внутренний поворот головки
- сгибание головки
- разгибание головки

#РАЗМЕР ТАЗА, В КОТОРОМ ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС ПЛОДА, НАЗЫВАЕТСЯ

- прямой
- правый косой
- левый косой
- прямой и поперечный

#ВТОРЫМ МОМЕНТОМ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ВСТАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- внутренний поворот головки
- сгибание головки
- разгибание головки
- внутренний поворот плечиков

#ЧЕТВЕРТЫМ ПРИЕМОМ ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ

- местонахождение головки по отношению ко входу в малый таз
- отношение предлежащей части к плоскостям малого таза
- массу плода
- положение, позицию плода

#ВТОРЫМ МОМЕНТОМ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- выведение головки из половой щели вне потуг
- воспрепятствование преждевременному разгибанию головки
- регулирование потуг
- освобождение плечевого пояса и рождение туловища

#В ТРЕТЬЕМ МОМЕНТЕ МЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ЗАДНЕМ ВИДЕ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПРОИСХОДИТ

- дополнительное сгибание головки
- разгибание головки
- внутренний поворот головки
- боковое сгибание туловища

#СХОЖИМИ МОМЕНТАМИ БИОМЕХАНИЗМА РОДОВ ПРИ ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ВИДАХ ЗАТЫЛОЧНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- сгибание головки, разгибание головки
- дополнительное сгибание головки
- боковое сгибание в поясничном отделе
- боковое сгибание в шейно-грудном отделе

#ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ С ЦЕНТРА НАЗЫВАЕТСЯ СПОСОБОМ

- Шульца
- Дункана
- Шредера
- Гентера

#ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ С КРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ СПОСОБОМ

- Дункана
- Шредера
- Гентера
- Шульца

#ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОСТАНОВКИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

- эргометрина малеат
- динопрост
- сальбутамол
- магния сульфат

#КОЖНЫМ АНТИСЕПТИКОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- спирт 70%
- хлоргексидин
- спирт 40%
- перекись водорода

#ВСАСЫВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, БИОТРАНСФОРМАЦИЮ И ВЫВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗУЧАЕТ

- фармакокинетика
- фармакодинамика
- фармакопоя
- хронофармакология